

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | <p align="center">FICHE N°16 : grossesse et prévention de l'hépatite B en Guyane.</p> | | <p>Validée par le conseil scientifique en date du : 25 septembre 2015</p> |
| <p>Domaine d'application : Suivi obstétrical</p> | <p>Rédacteur : A LOUISON, relecteur : Dr CARLES</p> | <p>Date d'application 26 09 2015</p> | <p>Diffusion : médecins, SF</p> |

Plan :

1. Hépatite B en Guyane
2. Grossesse, dépistage et prévention de l'hépatite B
3. Fiche CRAT du vaccin contre l'hépatite B
4. Recommandations du conseil scientifique du réseau Périnatal Guyane
5. Références

1. Hépatite B en Guyane

La Guyane Française est estimée comme une zone d'endémie modérée de l'hépatite B (entre 2 et 7 % de la population serait porteuse du virus de l'hépatite B (VHB)) comme le Surinam et le Guyana. La partie nord du Brésil est elle classée en zone de forte endémie (plus de 7% de la population porteuse). (1).

L'Organisation Mondiale de la Santé classe donc la Guyane Française dans les pays où **l'on doit proposer aux adultes la vaccination contre l'hépatite B** (2), recommandation également présente dans les recommandations 2015 du Haut Comité de la Santé Publique (HCSP) (4).

2. Grossesse, dépistage et prévention de l'hépatite B

EXTRAITS DU RAPPORT DE RECOMMANDATIONS 2014 :
« Prise en charge des personnes infectées par les virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C »
Sous la direction du Pr Daniel Dhumeaux et sous l'égide de l'ANRS et de l'AFEF,
Ministères des affaires sociales et de la santé. (3) Pages 36 et 37 :

« *DEPISTAGE Recommandations* : (...)

2. Elargir les stratégies de dépistage aux populations suivantes :

(...) les femmes enceintes **dès la première consultation prénatale**, (...)

3. Associer dans tous les cas la recherche **des trois virus VHB, VHC et VIH**, (...)

4. Associer les trois marqueurs recommandés par la HAS (**AgHBs, anticorps anti-HBs et anticorps anti-HBc**) pour le dépistage du VHB (...)

6. Conseiller les personnes dépistées dont les tests sont négatifs, en les informant (...) en leur proposant, selon leurs facteurs de risque, **une vaccination contre l'hépatite B.** »

Les dernières recommandations nationales proposent donc :

- de dépister les femmes enceintes dès la première consultation de grossesse,
- en associant VIH, VHC et VHB,
- pour VHB, d'associer au moment du dépistage : Ag HBs, Ac antiHBs et Ac antiHBc
- de proposer la vaccination si la personne présente un facteur de risque, comme par exemple si elle vit en zone d'endémie VHB modérée à forte.

Ainsi, pour l'hépatite B, outre la vaccination de tous les enfants de moins de 16 ans, le Haut Comité à la Santé Publique recommande également la vaccination contre l'hépatite B des **personnes amenées à résider en zones de moyenne ou de forte endémie.** (cf calendrier vaccinal 2015, p 15- 16-17, HCSP)(4)

3. Fiche CRAT du vaccin contre l'hépatite B (5)

Vaccin hépatite B

Mise à jour : 9 avril 2014

ENGERIX® - GENHEVAC B PASTEUR® - HBVAXPRO®

Le vaccin contre l'hépatite B est composé d'un antigène de surface.

Il est dépourvu de pouvoir infectant.

Il n'y a donc pas lieu de craindre une infection embryo-fœtale par le virus de l'hépatite B lors d'une vaccination en cours de grossesse.

ETAT DES CONNAISSANCES


Les données publiées chez les femmes enceintes exposées au vaccin contre l'hépatite B sont nombreuses et rassurantes, et concernent essentiellement le 2ème et le 3ème trimestre.

EN PRATIQUE

- **En prévision d'une grossesse**
 - Il n'y a aucun délai à respecter entre une vaccination contre l'hépatite B et le début d'une grossesse.
- **Vacciner une femme enceinte**
 - On peut vacciner une femme enceinte contre l'hépatite B, s'il y a une indication, quel que soit le terme de la grossesse.
- **Découverte d'une grossesse après vaccination**
 - **Rassurer** la patiente quant aux risques embryo-fœtaux du vaccin contre l'hépatite B.
 - Poursuivre la vaccination en cours de grossesse si toutes les doses n'ont pas été administrées.
- **Allaitement**
 - Ce vaccin est dépourvu de pouvoir infectant. Il n'y a donc pas lieu de craindre une infection de l'enfant lors d'une vaccination chez une femme qui allaite.
 - Au vu de ces éléments, cette vaccination est possible pendant l'allaitement. La vaccination de la mère n'est pas un motif pour modifier la vaccination de l'enfant lorsqu'elle est prévue.

4. Recommandations du conseil scientifique du réseau Périnat Guyane

**Pour toutes les femmes enceintes de Guyane,
compte tenu que la Guyane est une zone à risque de contamination VHB :**



* cf calendrier vaccinal 2015, p 15- 16-17, HCSP.

En complément de cette politique de rattrapage, la période prénatale est aussi l'occasion de vacciner tous les nouveaux nés contre l'hépatite B avant la sortie de maternité.

NB : Si la patiente n'a pas de droits ouverts à prise en charge des soins par la CGSS, les centres de prévention de la Croix Rouge peuvent vacciner les patientes gratuitement.

5. Références :

- (1) Center of Diseases Control and prevention, Recommendations for Routine Testing and Follow-up for Chronic Hepatitis B Virus (HBV) Infection, USA, page last update: May 31 2015, consulté le 17 juillet 2015 <http://www.cdc.gov/hepatitis/hbv/pdfs/chronichepbtestingflwup.pdf>
- (2) World Health Organisation, Hepatitis B Country or areas at risk, 2012 consulté le 17 juillet 2015 http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_HepB_ITHRiskMap.png?ua=1
- (3) Sous la direction du Pr Daniel Dhumeaux et sous l'égide de l'ANRS et de l'AFEF, Ministères des affaires sociales et de la santé. RAPPORT DE RECOMMANDATIONS 2014 « Prise en charge des personnes infectées par les virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C » http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Prise_en_charge_Hepatites_2014.pdf
- (4) Haut Comité à la Santé Publique, calendrier vaccinal 2015, France, 2015, consulté le 17 juillet 2015 http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Calendrier_vaccinal_2015.pdf
- (5) Centre de Référence des Agents Tératogènes (CRAT), hôpital Armand Trousseau, Paris, site internet consulté le 17 juillet 2015 <http://www.lecrat.org/sommaireFR.php3>